

問い合わせの回答

2011.6.21

本県の稲作振興につきまして平素から御協力いただきありがとうございます。

本県広聴広報課を通じてサクラミミズの件についてご照会がありました。

抜本的な駆除方法はございませんが、以前にも同様のお尋ねがありました関係で、これまで下記のとおりお答えしております。

今後ともよろしく願います。

記

(島根県農業技術センターからの回答)

サクラミミズの薬剤防除については昭和50年代に本県で行った試験事例はありますが、現在サクラミミズに対する登録はなく、施用量についても問題があり、お薦めできる防除薬剤はありません。耕種的対策もあまり有効なものはありませんが、本県では以下の指導を行っています。

- 1 サクラミミズは水もちが悪い水田や有機物投入量の多い水田に多いので、投入量を減らすか完熟堆肥を用いる。
- 2 落水を早めに行い田面を固め倒伏を抑制する（収量・品質には悪影響）

【参考情報】

<http://www.pref.shimane.lg.jp/nogyogijutsu/gijutsu/byougaityuu/in031.html>

島根県農林水産部農畜産振興課 農産グループ

グループリーダー 永岡佳訓

Tel 0852-22-5129 FAX 0852-22-6036

email nagaoka-yosinori@pref.shimane.lg.jp

<http://www.pref.shimane.lg.jp/nochikusan/>

問い合わせの回答 … 加西農業改良普及センター

2011.6.21

電話で回答だったが、同じような話しでいい駆除方法は無し。

灌水状態でミミズを窒息させることも可能だが、中途半端な灌水では代えて土(糞)を高くすることもあるから効果なし。

試しに、2日ほど灌水状態にしたときは、確かに糞は水に溶けていたが・・・水が引くと以前と同じように糞を積み上げてきた。…もう少し長期間の灌水状態にしないと窒息死は無理かも？

後は、中干しの時に十分干すことかな？